Aspects psychologiques

PARLER DE LA SEP AVEC MES PROCHES

*Ecole de la SEP, Samedi 18 mars 2017
Annabelle BOUAMMARI, psychologue*

AVANT D'EN PARLER

Darwin : « *Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement* ».

- Après le diagnostic :

La rupture créée par l'annonce du diagnostic : travail de deuil de l'état de santé antérieur, remaniement des projets prévus :

- Apprendre à vivre avec la **difficulté de se projeter** dans l'avenir, notamment en ce qui concerne la qualité de vie
- Le caractère aléatoire de la pathologie demande une réorganisation, d'apprendre « **à vivre autrement** », « **à composer avec** » :

S'adapter, pour mieux exister.

Appropriation et intégration plutôt qu'acceptation?

Appropriation : **stratégie active** de changements de comportement ou de travail sur soi pour vivre avec la maladie chronique.

Pourquoi active ? Pour ne pas être dans le fatalisme, la résignation.
Rétablir un projet de vie, reconstruire son identité, sa relation aux autres, se réapproprier son corps, penser à soi ...

La hiérarchisation des valeurs et activités témoigne que la vie « reprend le dessus ».

L'annonce de la maladie peut provoquer diverses réactions :

INTEGRATION

- **L'incrédulité passagère** ou minimiser l'impact sur la réalité
- **L'inquiétude symptomatique**
- **La révolte ou la colère** contre la maladie, associée au sentiment d'injustice
- **La négociation ou le marchandage** qui renvoie à l'impossibilité de revenir à la réalité antérieure
- **La capacité dépressive et l'anxiété** qui permettent l'intégration de ce qu'il va falloir dorénavant concilier avec sa vie

DISTANCIATION

- **Déni des symptômes, refus de la maladie.** Maladie intellectuellement entendue mais pas les émotions qui l'accompagnent.
- **Angoisse profonde** et malaise psychique
- **Attitude passive**, dépendance morale aux soignants ou à l'entourage.

- Parfois pour les patients :
- Acceptation est synonyme de renoncement :
« *si j'accepte, je baisse les bras et je subis...* »
 - Intégrer la maladie veut dire se laisser submerger. Ouvrir la porte aux émotions dont on a peur.
« *si j'accepte je vais me noyer..* »

Intégration : loin d'être une soumission à la réalité ou une démission aux efforts, c'est la meilleure base pour s'engager et agir au mieux. S'approprier la maladie, c'est aussi s'aimer : se laisser aller vers le changement qui va interroger nos loisirs, nos relations, nos investissements, nos intérêts.

« *Si tu n'acceptes pas, tu ajoutes l'angoisse à tes symptômes et te voilà malade de l'être* » André Comte-Sponville (philosophe)

Au final :

Quand la maladie ne prend plus une place centrale dans la vie et que d'autres centres d'intérêt peuvent être investis!

« La maladie c'est comme le permis de conduire, au début on a peur de prendre le volant puis avec le temps, on s'habitue. Même si on a toujours en tête qu'on peut avoir un accident et qu'il faut faire attention »

LES AUTRES : CHACUN SES REPRÉSENTATIONS !

Le contexte socioculturel est déterminant dans le rapport de la personne à sa maladie. Les **représentations**, ou **conceptions** de la maladie désignent la connaissance antérieure, ou *l'idée que se fait un patient* de tel ou tel point concernant sa santé ou son traitement.

A l'annonce de la maladie, des **images multiples** et variées arrivent inévitablement en tête du patient :

« *Si je vous dis SEP vous me dites ...* » → « *fauteuil* » / « ? »...

Important d'avoir en tête que nous parlons tous (soignants, soigné, entourage, accompagnants...) avec des représentations différentes, ce qui peut générer des incompréhensions...

M. D., vous viendrez faire votre traitement
à l'hôpital une fois par mois

De quelle couleur est cette pomme?

JAUNE

MARRON

MOUCHETEE

BEIGE

OCRE

TACHETEE

A quoi cela vous fait penser ?

A la bonne
odeur du café
le matin !

Au régime que
je dois faire !

Au thé que ma
grand-mère
m'offrait quand
j'allais la voir

Au café ! Oups
et à la cigarette
que je ne fume
plus avec !

Un des axes du soutien psychologique et de l'intégration de la maladie : aider l'autre à mettre un sens moins souffrant sur les choses.

L'ANNONCER À L'ENTOURAGE

Quand ?

- ❖ Lorsque vous serez prêt !
- ❖ Attendre un contexte particulier ?
- ❖ Temporalité de l'annonce : période de suspicion...

• *Comment ?*

- ❖ **Sans écouter** : permettre à l'autre de poser des questions
- ❖ En évitant d'être **trop technique** : les termes peuvent générer des incompréhensions ou angoisses
- ❖ En **comité restreint**
- ❖ En évitant le téléphone ou internet : **privilégier quand on le peut l'échange direct**
- ❖ En procédant de **manière très progressive** : des prémices de la maladie jusqu'à l'annonce diagnostique, pour permettre aux proches de mener le raisonnement avec vous.
- ❖ Les **objets de médiation** peuvent être utiles: plaquette d'information, livre...
- ❖ N'oubliez pas d'aborder **les solutions et alternatives positives**

• **Pourquoi ?**

❖ Pour **bénéficier d'un précieux soutien** :

- ❖ *Soutien émotionnel (pour bénéficier d'une écoute, d'une épaule)*
- ❖ *Soutien d'estime (revalorisation)*
- ❖ *Soutien informatif (conseils...)*
- ❖ *Soutien matériel (organisation, trajet, financier..)*

❖ Pour **se soulager** d'un lourd fardeau, pour partager

❖ Pour **éviter de laisser trop de place à l'imaginaire**

❖ Pour **se préserver de la solitude et de l'incompréhension, du surmenage**

❖ Pour aller vers **des « bénéfiques secondaires »**

Recréer ou renforcer des liens, se libérer de certaines contraintes sociales et familiales (repas de famille!) s'accorder du temps, prendre soin de soi sans culpabilité, obtenir de l'aide...

L'incertitude et l'imagination

Préférer ne rien dire... ça se respecte !!!

- ❖ Pour **ne pas être déçu de la réaction des autres** , maladresse, tristesse.
- ❖ Pour **protéger les autres**
- ❖ Pour **se protéger soi-même....** Pour éviter les questions embarrassantes, d'être perçu comme quelqu'un de vulnérable, malade...

Du côté de l'entourage, il n'est pas toujours facile d'affronter ce silence. Il convient de le respecter, si déstabilisant soit-il, tout en montrant qu'on ne se désintéresse pas de la situation.

• **Les réactions...**

« C'est souvent quand on se sent prêt à recevoir la réaction de l'autre que l'on peut annoncer sa maladie »

- Conseils, expériences *« je connais quelqu'un... »*
- Changement des habitudes (alimentaire par exemple)
- Surprotection *« maintenant je vais prendre soin de toi »*
- Dédramatisation *« non, mais c'est peut-être autre chose »*
- Humour *« tu nous les feras toute! »*
- Déni se protéger d'une réalité trop difficile à accepter

Réaction psychologique naturelle : Le choc, le déni, la révolte, la négociation, la réflexion et l'acceptation, les mêmes étapes que vous avez vous-même traversé...

**PAS DE
RECETTE
MIRACLE...
MAIS QUELQUES
CONSEILS!**

- « Suis-je à l'aise aujourd'hui pour expliquer ce qu'il m'arrive? »
- « Ai-je bien saisi les tenants et aboutissants de cette maladie? »
- « Suis-je préparé à certaines réactions pouvant me bouleverser, m'agacer? »
 - « Pourquoi faire cette annonce? »
 - « Avec qui je souhaite partager cette annonce? »

Dire n'est pas se plaindre

Rassurer sans banaliser

Ne pas dire ou ne pas tout dire

Vous êtes libres de cette décision

**LA MANIÈRE DONT NOUS PRÉSENTONS LES
CHOSSES DÉPEND FORTEMENT DE NOS
PROPRES REPRÉSENTATIONS ET DE NOTRE
PROPRE ACCEPTATION**

L'ANNONCE AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS

- *Est souvent source d'inquiétudes :*
 - ❖ La **peur** de le/les « traumatiser »
 - ❖ La **culpabilité** d'imposer à son enfant la maladie et de lui enlever son insouciance
 - ❖ La peur de **ne plus assurer son rôle de parent** comme on l'avait imaginé : *parent protecteur face aux souffrances de la vie*
 - ❖ La peur de **ne pas savoir trouver les mots justes**, de pleurer

VRAI / FAUX

- *Les enfants de moins de 5 ans sont trop petits pour se rendre compte qu'un de leur parent est malade*

Vrai

Faux

VRAI / FAUX

- *Les enfants de moins de 5 ans sont trop petits pour se rendre compte qu'un de leur parent est malade*

Vrai

Faux

VRAI / FAUX

- *Les enfants ont tendance à aggraver la situation quand on ne leur dit rien*

Vrai

Faux

VRAI / FAUX

- *Les enfants ont tendance à aggraver la situation quand on ne leur dit rien*

Vrai

Faux

• *Mais... Pourquoi est-ce si difficile?*

❖ Pour un adulte l'annonce du diagnostic est souvent vécue comme une sidération, un choc, un traumatisme.

Nous pouvons être effrayés à l'idée de **provoquer ces sentiments chez nos enfants** (+ l'enfant est jeune + la peur est grande)

❖ Parce qu'on peut être confronté aux éventuelles **questions** de nos enfants auxquelles on ne se sent **pas capable de répondre**, auxquelles on ne veut parfois pas répondre

❖ Parce qu'il faut d'abord pouvoir **gérer ses propres émotions**, angoisses

• *Les peurs, en tant que parents...*

❖ Peur de ne pas/ plus être un bon parent ?

- si vous ne pouvez plus faire certaines activités avec lui, vous serez **toujours présent pour assister à ses progrès et le soutenir**

❖ Peur de perdre votre autorité parentale ?

- L'éducation ne passe pas par les capacités physiques, elle passe par **la manière de se comporter et par la communication**. Vos enfants pourront « tester vos limites » afin de s'assurer que vous êtes toujours capable de vous occuper d'eux. Continuer de réagir comme avant, de dire « non » quand cela est nécessaire

❖ Peur d'être une source de soucis pour mon enfant

- Une SEP s'impose dans un foyer et vient modifier toutes les relations familiales. Ces changements peuvent parfois renforcer les liens familiaux. Vous n'êtes **pas responsable** de la situation. Les enfants s'adaptent parfois plus facilement à la SEP que leur parent. Ne sous-estimez pas leurs ressources!

AVOIR des enfants : ETRE parent

- ❖ Prodiguer des soins
- ❖ Donner de l'éducation
- ❖ Etre en relation

Pour l'enfant...

- ❖ Vous êtes le prisme par lequel il décode le monde
- ❖ Observation fine qui capte surtout la vie émotionnelle
- ❖ L'enfant aussi a besoin de mettre du sens sur ce qu'il perçoit
- ❖ Il risque de construire une réponse imaginaire pire que la réalité

• *Alors... leur annoncer... Pourquoi ?*

- ❖ Parce qu' on leur demande de **ne pas savoir...** et en même temps de pouvoir **comprendre**
- ❖ Parce que souvent l' imaginaire entraînent des **réponses plus inquiétantes** encore (mort, séparation, propre responsabilité...)
- ❖ Parce que si l' on dit les choses, on peut aussi **les rassurer, leur expliquer,** les accompagner et limiter l' intensité des comportements
- ❖ Parce qu' être parent c' est aussi permettre à son enfant **de grandir avec les « manques »**
- ❖ Parce que les enfants sont de bons observateurs et **ils remarquent les changements** dans leur quotidien et l' anxiété de leurs parents même quand on croit les avoir préservés...

● *Les enfants, que peuvent-ils comprendre ?*

❖ Moins de 2 ans :

❖ Utiliser des notions simples

❖ Utiliser des situations qu' il connaît

❖ Ce n' est pas grave s' il ne comprend pas tout

❖ La communication s' appuie sur l' **intonation de la voix** et des explications simples « se soigner » « faire une pique »

❖ De 3 à 9 ans :

- Ne se projettent pas et **n'anticipent pas** les faits de manière anxieuse comme le feraient des plus grands
- **Confiance dans la parole des parents**, ils retiennent les comportements, utilisez des mots simples et imagez, soyez attentifs aux émotions que vous montrez, préférez un moment où vous vous sentez **bien émotionnellement**, calme et peu stressé
- Capacité attentionnelle courte ; limitez le nombre d'informations et **agissez par étapes**
- **Anxiété de séparation** fréquente à cet âge là, important de le rassurer sur le fait que vous souhaitez qu'il poursuive normalement ses activités et que vous saurez prendre soin de vous ou avoir l'aide nécessaire si besoin

❖ A partir de 10 ans:

- Malgré les apparences (parfois) les adolescents ou pré-adolescents écoutent ce qu'on leur dit ! mais ils se basent aussi sur ce qu'ils observent : **ne pas leur cacher des informations ou être dans le non-dit.**
- Contrairement aux plus jeunes, ils sont en mesure de **se projeter dans l'avenir**, leur crainte principale est souvent **le décès**. Il est important de les rassurer à ce sujet.
- Il est utile de les prévenir de **ne pas chercher seul** des informations **sur internet**. Chaque SEP est unique et les informations qu'ils trouveront ne seront pas forcément adaptées à votre situation. Vous êtes la personne la mieux placée pour répondre à leurs questions. Ils peuvent aussi rencontrer un professionnel s'ils le souhaitent.

• *Comment peuvent-ils réagir?*

❖ Souvent on observe un soulagement **physique** rapide chez l'enfant après l'annonce

❖ Réactions peuvent être différentes au sein d'une même fratrie, certains peuvent montrer **plus d'inquiétudes que d'autres**. Pensez à prévenir son **pédiatre**, il pourra être particulièrement attentif à d'éventuels signes de mal-être de votre enfant. Vous pouvez aussi **en parler à l'école**.

❖ Signes :

- Troubles du sommeil
- Troubles de l'alimentation
- Craintes excessives
- Troubles du développement (régression)
- Troubles scolaires

- *Certaines réactions peuvent être déroutantes pour les parents...*

- ❖ La majorité des enfants a pour première question « *est ce que tu vas mourir ?* »
- ❖ Les enfants peuvent sembler *ne pas se préoccuper* de la maladie, continuer à jouer , et paraître ne pas avoir entendu
- ❖ Certains enfants peuvent *se fâcher* à l'abord de la maladie ou exprimer le désir que la conversation cesse plus rapidement
- ❖ Les adolescents, de la même manière que les plus jeunes peuvent réagir de *manière agressive* ou sembler au contraire *indifférents* à la maladie
- ❖ Les enfants peuvent *se rapprocher de leur parent malade* et délaissé leurs activités

- *Comment expliquer ?*

- ❖ Expliquer simplement **en illustrant**, par exemple :

- « *le cerveau = un ordinateur qui commande le corps. Qui envoie les ordres. les nerfs = câbles électriques qui véhiculent les informations entre le cerveau et le corps dans la SEP, câbles électriques peuvent être abimés, fonctionnent plus lentement en attendant que la réparation se produise. Cela peut entraîner certains troubles comme des difficultés à marcher, une fatigue, des problèmes de vue... »*

- ❖ Si vous avez plusieurs enfants il est important de le leur annoncer **vous-même, en présence de tous**, et en adaptant votre discours au plus jeune. Vous pouvez ensuite reprendre les choses individuellement avec chacun

- ❖ **Ne rentrez pas dans des explications complexes**

- Lors d'une hospitalisation : **Expliquez la raison** maintenez le contact le plus possible, téléphone...
- Expliquer les **symptômes** qui peuvent être perçus comme du **désintérêt** : fatigue, troubles cognitifs...
- Savoir **doser les informations** : être honnête ne veut pas dire que vous devez tout dire à votre enfant s'il n'est pas prêt à tout comprendre.
- Garder en tête qu'il est préférable de **ne pas mentir**.
- vous êtes le **meilleur juge** pour savoir ce qu'il est prêt à assimiler.
- Ne pas le surcharger d'informations mais **ouvrir le dialogue** afin que vos enfants osent vous poser leurs questions
- Le rassurer, le questionner sur ce qu'il sait déjà

● *Conclusion*

❖ **La parole et l'information soulage**

- ❖ Les études montrent que **la majorité des enfants s'adaptent** en peu de temps
- ❖ Les enfants souhaitent la « **vérité avec des mots gentils** » et sont **capable d'exprimer leurs besoins**. Ils savent dire ce qui les inquiète.
- ❖ **Veiller à garder une relation parent/ enfant**, à fixer les limites nécessaires à l'éducation, préserver les rôles de chacun.

La maladie ne change pas votre rôle auprès de votre enfant.

- *Quelques outils pour vous accompagner...*

- ❖ De plus en plus, les médecins/ infirmiers/ psychologues proposent de vous recevoir et de les recevoir, de donner des explications

- Ne pas hésitez à les solliciter !!!

- ❖ Des groupes de parole pour les enfants et adolescents

- ❖ Des groupes de parole pour les adultes

- ❖ Des outils pour médiatiser la communication avec les enfants

LES LIVRES POUR ENFANTS....

- Souvent conseillés par votre neurologue/ infirmière ou psychologue, ils permettent d'avoir un support adapté pour parler de la maladie avec vos enfants.
- Nous vous conseillons souvent de d'abord les consulter vous-même afin de voir si cela correspond à ce que vous avez envie de leur communiquer et à votre représentation de la maladie
- Ils peuvent être ensuite un moyen pour les enfants de réactiver le dialogue, en ressortant le livre par exemple.

« ERNESTOR LE CASTOR »

- Pour les plus jeunes... aux alentours de $\frac{3}{4}$ ans
- Ernestor participe à une course en équipe comprenant des épreuves sportives et des épreuves intellectuelles. Il concourt aux côtés de sa maman malade. Ils décident de se répartir les épreuves.
- Téléchargement pdf sur le site: <http://www.arsep.org>

« *BENJAMIN ET SA MAMAN* »

- A partir de 6/7 ans... texte dense.
- « La mère de Benjamin est atteinte d'une sclérose en plaques et le petit garçon apprend pour la première fois ce qu'est une poussée dans cette maladie. Benjamin commence à se familiariser avec la maladie de sa mère. Ses parents et ses amis l'aident dans cet apprentissage. Il comprend qu'il peut aider sa maman, mais qu'il ne doit pas pour autant se sacrifier. Il en sait bientôt assez pour présenter un exposé en classe. Ce qu'il a appris de plus important c'est que sa maman ne mourra pas de cette maladie. »
- Téléchargement pdf sur le site:
<http://www.ligue-sclerose.fr>

« SAM ET PAT' »

- BD, à partir de 8/9 ans
- Plusieurs petites histoires reprennent différentes problématiques que peut rencontrer une famille quand un des membres est touché par la maladie, ici la maman :
 - l'annonce aux enfants
 - l'impact de la maladie sur le choix des vacances,
 - la gestion du traitement
 - la venue d'une aide à domicile...

« 1 BIS RUE DE L'ESPOIR »

- BD, à partir de 10/12 ans
- Antoine est un ado de 14 ans. Il a une petite sœur Louise âgée de 10 ans. Sa mère, Sophie, est atteinte d'une sclérose en plaques. Antoine a bien du mal à accepter la maladie de sa maman et ressent un profond sentiment d'injustice. Patiemment la famille va à nouveau engager le dialogue. Sa maman va parvenir à lui montrer qu'elle reste la même malgré la maladie »

LA SEP ET LE COUPLE

- Un impact avéré sur les relations de couples :
la maladie exacerberait les tensions qui existent déjà
- Quelques chiffres :
 - *52% des patients évaluent le retentissement de la SEP sur leur vie conjugale et amoureuse comme très important ou plutôt important*
 - *Contre 39% de l'entourage*
 - *76% des personnes disent avoir peur de devenir une charge pour l'autre*
 - *25% des personnes ayant un diagnostic SEP récent ont la crainte que la maladie ne mette un terme à leur relation.*

- *Importance de « l'accordage » sur la question de la souffrance provoquée par la maladie :*
- *Si le proche surestime la souffrance du patient il va avoir tendance à laisser moins d'autonomie et s'épuiser*
- *Si le malade surestime le fardeau de la maladie, il risque de s'enfermer sur lui-même*

Important d'avoir les mêmes représentations, de trouver une harmonie.

→ Du côté de la personne souffrant de SEP ...

- ❖ **Des réajustements nécessaires, une nouvelle répartition des tâches**

« Je ne peux plus tout assumer à la maison »

- ❖ **Une incompréhension**

« il/elle me demande toujours de faire plus d'efforts, me trouve paresseu(x)se »

- ❖ **Une attente parfois disproportionnée**

« je voudrais qu'il/elle comprenne quand ça va et quand je ne peux pas sans que j'ai à le lui dire »

- ❖ Eviter la **surprotection** → **surmenage**

« je préfère faire comme si ça allait »

Des outils...

- Une communication essentielle : Informer l'autre sur ses ressentis, sur ses besoins
Ne pas s'isoler chacun de son côté
Responsabilité d'éventuelles ruptures ou éloignements est une responsabilité partagée !
- Respecter le rythme de l'autre dans l'acceptation et dans la recherche d'un nouvel équilibre
- Solliciter une aide extérieure lorsque la communication est bloquée

→ Du côté du proche...

❖ **Une juste position à trouver...**

« Parler de la maladie ou feindre de l'oublier? Inciter l'autre à se reposer ou l'encourager à se dépasser ? La décharger de certaines tâches ou attendre d'être sollicité ? »

❖ **Gérer ses propres craintes** par rapport à la maladie

❖ **Ne pas s'oublier.** Attention portée sur le conjoint peut parfois devenir une source de frustration. Important d'exprimer ses émotions et de ne pas se sentir coupable de tels ressentis.

Des outils...

1. **S' informer** pour vous aider à comprendre cette maladie, ses symptômes et ses effets
2. **S' impliquer** en accompagnant aux visites chez le médecin, en proposant de réorganiser ensemble les tâches domestiques
3. **Respecter** Ne cherchez pas à tout faire seul ou à en faire trop. Chacun doit conserver ses propres intérêts, ses activités, ses aspirations, ses rôles et ses rêves...Veiller à préserver au malade sa capacité à décider
4. et bien sûr **communiquer** + + +

La qualité de l'accompagnement dépend de la qualité de la relation que l'on vivait auparavant, surtout au niveau du couple

→ Si je suis célibataire ?

❖ **La crainte de ne jamais pouvoir rencontrer la bonne personne...**

« Qui voudrait d'un conjoint malade ? »

❖ **Baisse de confiance en soi**

« Qu'est ce que je peux apporter à quelqu'un ? »

❖ **Comment annoncer la maladie à un nouveau partenaire ?**

« Quand le dire ? Dès le premier rendez-vous ? »

Garder en tête :

→ *Pas de moment plus opportun*

→ *Ne pas s'identifier qu'à une maladie*

PARLER DE LA SEP AVEC SES PARENTS, AVEC SES FRÈRES ET SŒURS...

- LES « CONTRE »

- Une position infantile...encore !

Surprotection des parents: réflexe de protéger la progéniture

« Mes parents ne cessent d'être sur mon dos, de me demander si je me repose assez »

« Je ne peux rien faire sans qu'on mette ma fatigue sur le compte de la maladie.»

- LES « POUR »

- **Ne pas mentir**

« Il a longtemps été impossible d'en parler à mes parents et à mes sœurs. Je ne trouvais pas de formulation, de moment opportun. Ne rien dire... c'est comme si je mentais.... »

- **Etre compris**

« Mes proches s'éloignent... d'un côté, quand ils m'appellent, je suis souvent fatigué et je décline les invitations. C'est peut-être eux qui pensent que je m'éloigne... Leur parler de la maladie pourrait me permettre de leur expliquer que ma fatigue n'est ni de la flemme, ni du désintérêt... »

- Une culpabilité partagée

- *Du côté des parents :*

Sentiment de culpabilité face à la crainte d'avoir transmis la maladie → *rassurer sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire*

- *Du côté du malade :*

Peur de faire de la peine, de décevoir, d'être à l'origine d'un souci supplémentaire

« Je ne voulais pas en parler à mes parents. Je voudrais pouvoir m'occuper d'eux. Ils vieillissent et ils ont besoin de moi, je ne veux pas que ce soit encore l'inverse. Je ne veux pas être un poids pour eux. »

CONCLUSION

- Une annonce **qui se pense et qui se prépare**. Pas de recette miracle. Dépend de notre propre acceptation et représentation
- **Conserver son identité** de parent, de collègue, d'enfant, de femme ou d'homme sexué et de ne pas se perdre dans une identité de malade. Rester soi-même

Je ne SUIS PAS
une SEP, je
PORTE une SEP.

Je suis MOI, la
maladie ne me
représente pas.

CONCLUSION

- **La communication plutôt que l'interprétation...** le risque des non-dits et du silence. Exprimer ses besoins, demander de l'aide ou, au contraire, de la tranquillité.
- **Utiliser des outils ou des échelles** pour parler des douleurs ou de la fatigue
- Communiquer pour mieux se comprendre !

MERCI