

# Fampyra®

fampridine (Biogen Idec)

## Présentation

Comprimé pelliculé à libération prolongée 14mg  
Boîte de 28 et de 56 comprimés



## Indication

À quoi ça sert ?

Traitement symptomatique des troubles de la marche des patients adultes atteints de sclérose en plaques et présentant un handicap à la marche (EDSS 4-7) quelle que soit la forme de la maladie.

## Mécanisme d'action

Comment ça marche ?

Le Fampyra® est un inhibiteur des canaux potassiques qui améliore l'influx nerveux dans les axones démyélinisés, permettant ainsi une meilleure conduction dans le système nerveux central.

## Posologie

Comment le prendre ?

- 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir à 12h d'intervalle, comprimé à avaler **en entier en dehors des repas** (2h après ou 30mn avant).
- Prescription initiale limitée à **14 jours**.
- Une épreuve de marche chronométrée est recommandée avant la mise en route du traitement et après 14 jours afin d'évaluer l'amélioration de la marche.
- Interruption du traitement en l'absence de bénéfice au bout de 14 jours.
- Prescription réservée aux spécialistes en neurologie.

## Effets Indésirables

- Baisse du seuil épiléptogène pouvant entraîner un risque de crise comitale.
- Paresthésies, céphalées.
- Etourdissements, troubles de l'équilibre.
- Somnolence ou insomnie et/ou anxiété
- Augmentation des douleurs neurogènes préexistantes liées à la SEP.



## Contre-Indications

- Patients épileptiques ou ayant des antécédents d'épilepsie.
- Insuffisance rénale, même légère ou modérée (clairance de la créatinine inférieure à 80mL/mn).
- Traitement concomitant par Cimétidine®, contre-indication relative avec les autres anti-arythmiques.
- Précaution d'emploi avec la prescription concomitante des bêta-bloquants propranolol et carvedilol, de l'antidiabétique oral Metformine®, des psychostimulants Mantadix® et Modiodal®.



## Grossesse, Allaitement

Grossesse et allaitement contre-indiqués.



## Surveillance, Précaution d'emploi et Mise en garde

### Bilan avant le traitement

Fonction rénale par calcul de la clairance de la créatinine.

### Mise en garde

- Pas d'instauration dans le mois suivant la mise en route du Gilenya®.
- Administration avec prudence chez les patients ayant des troubles du rythme cardiaque ou des troubles de la conduction cardiaque sino-auriculaire ou auriculo-ventriculaire.

### Oubli

En cas d'oubli, prenez le médicament dès que vous constatez l'omission puis reprenez la suite normale du traitement.

Si la prochaine prise doit avoir lieu dans moins de 6 heures, ne prenez pas la dose omise et reprenez le traitement normalement.  
Il est important de ne pas doubler la dose pour compenser.

Contact